


**COLLEGE SAINT-BARTHELEMY**

**MATHEMATIQUE**

**PREMIERE ANNEE**



## ***SOLIDES ET FIGURES***

**Troisième partie : Les figures planes**

***Médiatrice et Bissectrice***

***Distances - Angles***

***Triangles et quadrilatères***

**ANNEE SCOLAIRE 202... - 202...**





# Compétences



## Expliciter les savoirs et les procédures

- ✎ Comprendre et utiliser, dans leur contexte, des termes usuels propres à la géométrie des figures planes.
- ✎ Reconnaître et comparer différents types de représentations planes de solides.
- ✎ Énoncer et comprendre quelles propriétés suffisent pour construire des figures géométriques particulières. (Définitions et propriétés)
- ✎ Reconnaître, comparer, différencier et classer des figures planes.
- ✎ Relever des régularités dans des familles de figures planes et en tirer des propriétés relatives aux angles, aux distances et aux droites remarquables.
- ✎ Reconnaître des angles adjacents, complémentaires, supplémentaires.
- ✎ Déduire des mesures d'angles à l'aide de propriétés dans des situations simples.

## Appliquer une procédure

- ✎ Tracer des figures simples avec des instruments.
- ✎ Reproduire une figure plane en vraie grandeur ou à l'échelle.
- ✎ Tracer une droite perpendiculaire à une autre.
- ✎ Tracer la médiatrice d'un segment ; la bissectrice d'un angle.
- ✎ Tracer la hauteur d'un triangle ou d'un parallélogramme.
- ✎ Tracer une médiane d'un triangle ou d'un quadrilatère.
- ✎ Tracer un hexagone régulier et un carré inscrits à un cercle.
- ✎ Mesurer l'amplitude d'un angle avec un rapporteur.
- ✎ Tracer un angle d'amplitude donnée.
- ✎ Reporter des angles.

## Résoudre un problème

- ✎ Résoudre des problèmes d'aires, de volumes, de développement.
- ✎ Résoudre des problèmes de construction à propos de triangles, de cercles ou de quadrilatères.
- ✎ Résoudre des problèmes faisant intervenir des longueurs ou des aires de figures planes.
- ✎ Résoudre des problèmes de construction à propos d'angles de mesures particulières



# EXPLORATION : LES DISTANCES



1. Une chèvre broute dans un pré de 80 m sur 55 m. Elle est attachée par une corde de 18 m à un piquet situé au départ n'importe où dans le pré.
  - a) Dessine le pré à l'échelle 1/1000 et montre sur ce dessin la partie du pré que la chèvre peut brouter.
  - b) Où placer le piquet le lendemain pour que la chèvre dispose de la même quantité d'herbe ? (Hachure toute la zone).
  
2. La chèvre est maintenant attachée au coin d'une étable (dans un pré) de 5 m sur 3 m mais avec une corde de 4 m
  - a) Dessine cette étable à l'échelle 1/100 et montre sur ce dessin la partie du pré que la chèvre peut brouter.
  - b) Même question si la corde mesure 8 m puis 10 m.



Aide : <https://www.geogebra.org/m/ugzZjfJk>

 **Théorie page 6**

# CHAPITRE 9 : CONSTRUCTION ET PROPRIETES DE FIGURES PLANES

## 1. LES DISTANCES

### Exploration : Les distances

#### 1.1. Distance entre deux points

Etablir la distance entre deux points **A** et **B** signifie:

- 1] Choisir une unité. Ex: le millimètre - *mm*
- 2] Etablir une mesure, c'est-à-dire compter le long du segment **[AB]** le nombre de fois que l'unité choisie est comprise entre **A** et **B**. Ex: 27.

Résultat:

si l'unité choisie est le millimètre	}	alors la distance est 27 mm.
et		
si la mesure est 27		

#### 1.2. Notations :

On notera:

L.L. : La **distance** entre le point A et le point B est de 27 mm

L.M. :  $d(A,B) = 27 \text{ mm}$

Ou bien :

L.L. : La **longueur** du segment **[AB]** est de 27 mm

L.M. :  $\overline{AB} = 27 \text{ mm.}$



#### 1.3. Exercices


- 1] Construis un point **A** à 2 cm du point **X** donné ; construis un deuxième point **B** à 2 cm du point **X**.  
 Construis tous les points du plan de la feuille distants de 2 cm du point **X**.  
 La figure formée par l'ensemble de tous les points dessinés est.....

X


.



- 2] Dessine tous les points situés à 2 cm de **C** et à 2 cm de **D**.  
Combien en as-tu trouvé ? Nomme-les.



- 3] Place les points **G** et **H** situés à 2 cm de **T** et à 3 cm de **U**.



## 2. LE COMPAS

### **Exploration : Construction de triangles**

Le compas permet de dessiner des cercles mais aussi de reporter des distances.


**Un cercle de centre O et de rayon r ( $C_{(O;r)}$ ) est l'ensemble des points du plan situés à une distance r du point O.**

**Le disque de centre O et de rayon r est l'ensemble des points du plan situés à une distance du point O inférieure ou égale à r.**



# EXPLORATION : CONSTRUCTION DE TRIANGLES


1. Les 9 triangles ci-dessous ont été dessinés à main levée :



Aide : <https://www.geogebra.org/m/gVXW6rSZ>

- Reproduis-les en vraie grandeur.
- Ecris un message permettant à quelqu'un qui ne voit pas le triangle DEF de le reproduire.


2. Reproduire à la latte non graduée et au compas le triangle ci-dessous de deux manières différentes.




Théorie page 9

## 2.1. Reporter un segment de droite donné

- Construis à la latte *non graduée* et au compas un segment  $[XY]$  qui à la même longueur que le segment  $[AB]$  donné.



- Construis à la latte *non graduée* et au compas, un triangle dont les côtés ont respectivement les mêmes longueurs que les trois segments ci-dessous.





- Construis à la latte *non graduée* et au compas un hexagone régulier dont le côté est de la même longueur que le segment  $[AB]$  donné.



**2.2. Report d'un angle donné**

- Construis à la latte **non graduée** et au compas un angle  $\widehat{XYZ}$  de même amplitude que l'angle  $\widehat{O}$  donné ci-dessous.



- Quelles consignes donnerais-tu à ton voisin pour qu'il réalise la construction demandée ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **Solution retenue par la classe**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Aide : <https://www.geogebra.org/m/gk7efvfg>

### 3. LE RAPPORTEUR

#### 3.1. Les angles

##### 1) Définition de l'angle

Un angle est la figure formée par deux demi-droites de même origine et par une des deux régions du plan délimitée par celles-ci.




##### 2) Remarques et vocabulaire

- Les demi-droites  $[OA$  et  $[OB$  sont les **côtés** de l'angle.
- L'origine commune à ces demi-droites est le **sommet** de l'angle.
- La mesure de l'angle ou son ouverture est son **amplitude**. Elle se mesure en degré. Le degré se divise en 60 minutes; la minute se divise en 60 secondes.
- Les demi-droites délimitent en fait deux angles: I et II. Nous parlerons d'un **angle saillant** lorsqu'il est plus petit qu'un angle plat (II) et **angle rentrant** quand il est plus grand (I). Si rien n'est précisé, nous considérerons toujours l'angle saillant.

##### 3) Notations


- Un angle se note
  - soit par trois de ses points, le sommet placé au centre de la notation étant surmonté d'un accent circonflexe, les deux autres points étant choisis sur chacun des côtés. Ex:  $\hat{A}OB$
  - soit par le sommet numéroté et surmonté de l'accent circonflexe. Ex:  $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \hat{O}_3$
  - soit par une lettre grecque Ex:  $\alpha, \beta, \gamma$





- La mesure de l'angle  $\hat{A}OB$  se note  $\hat{A}OB^\circ$  ou  $\hat{O}_1^\circ$  ou  $\alpha^\circ$ .

#### 3.2. Mesure d'un angle - le rapporteur

Le rapporteur est gradué de  $0^\circ$  à  $180^\circ$  (parfois par deux échelles qui vont dans des sens opposés). Son centre est situé à l'intersection, de la droite **a** passant par  $0^\circ$  et  $180^\circ$ , et de la droite **b** perpendiculaire à **a** passant par  $90^\circ$ .



Voici deux exemples de mesures d'angle :



### 3.3. Classification d'angles en fonction de leur amplitude

#### 1) L'angle droit

**Un angle est droit ssi ses côtés sont perpendiculaires.**

Par convention, l'amplitude de l'angle droit est  $90^\circ$ .




$P\hat{O}K$  est un angle droit

$[OP] \perp [OK]$

$P\hat{O}K = 90^\circ$

#### 2) L'angle aigu

**Un angle est aigu ssi son amplitude est inférieure à  $90^\circ$ .**




$T\hat{O}K$  est un angle aigu

$T\hat{O}K < 90^\circ$

#### 3) L'angle obtus

**Un angle est obtus ssi son amplitude est supérieure à  $90^\circ$ .**



$S\hat{O}K$  est un angle obtus


$S\hat{O}K > 90^\circ$

#### 4) L'angle nul et l'angle plein

L'angle nul et l'angle plein sont des angles dont les côtés sont confondus.

L'amplitude de l'angle nul est  $0^\circ$ .

L'amplitude de l'angle plein est  $360^\circ$  (soit quatre fois l'amplitude de l'angle droit).



Suivant l'angle considéré, on a:


$M\hat{O}K = 0^\circ$  (angle nul)

ou

$M\hat{O}K = 360^\circ$  (angle plein)

#### 5) L'angle plat

L'angle plat est un angle dont l'amplitude vaut  $180^\circ$  (soit 2 fois l'amplitude de l'angle droit).




$N\hat{O}K = 180^\circ$

**Remarque:** Un angle plat n'est jamais seul, c'est pourquoi il s'agira de préciser quelle est la partie du plan considérée par un arc.

### 3.4. Vocabulaire à propos de quelques angles particuliers

#### 1] Angles adjacents


Deux angles sont **adjacents**  
ssi  
ils ont un côté commun et sont situés de part et d'autre de  
ce côté commun.



[OX est commun à  $\alpha$  et à  $\beta$  et  
 $\alpha$  et  $\beta$  sont situés de part et d'autre de [OX


Les deux dessins suivants, représentent-ils des angles adjacents ? → <https://www.geogebra.org/m/QCpkSJaX>

OUI - NON



Justifie : .....  
.....  
.....

OUI - NON



Justifie : .....  
.....  
.....

#### 2] Angles complémentaires

Deux angles sont **complémentaires**  
ssi  
la somme de leurs amplitudes est  $90^\circ$ .

#### 3] Angles supplémentaires

Deux angles sont **supplémentaires**  
ssi  
la somme de leurs amplitudes est  $180^\circ$ .

### 4. MEDIATRICE D'UN SEGMENT

#### 4.1. Définitions



- Dessine tous les points de la feuille qui peuvent être sommet d'un losange qui a [AB] pour une de ses diagonales.

Aide : <https://www.geogebra.org/m/ZEQANf3D>



- Pour construire ces losanges, je dois .....
- .....
- .....
- .....

Constatation:

Tous les points  $P_1, P_2, P_3, \dots$  sont .....

Cette droite, qui est l'ensemble de tous les points équidistants de  $A$  et de  $B$ , sera appelée **médiatrice du segment  $[AB]$** .

Première définition de la *médiatrice d'un segment* → <https://www.geogebra.org/m/vkgpc8tm>

**Dans un plan, la médiatrice d'un segment est l'ensemble de tous les points du plan, équidistants des extrémités du segment.**

Remarques

- Dans le chapitre sur les transformations du plan (page 21), tu as dessiné la médiatrice du segment  $[AB]$ . D'après l'énoncé de cet exercice, tu peux conclure que: dans le plan, la médiatrice d'un segment est aussi

.....

Deuxième définition de la *médiatrice d'un segment*

.....

.....

- Cette droite est aussi une des diagonales de chacun des losanges tracés. Tu sais que les diagonales d'un losange sont ..... et se coupent en .....


Troisième définition de la *médiatrice d'un segment*

.....

.....

**4.2. Construction de la médiatrice d'un segment**

Soit le segment  $[XY]$ . Pour construire la médiatrice de ce segment, il suffit de construire un losange qui admet  $[XY]$  comme diagonale.




Aide : <https://www.geogebra.org/m/dtskmFxy>



## 5. BISSECTRICE D'UN ANGLE

### 5.1. Définitions

- Construis (par pliage ou ...) l'axe de symétrie de cet angle :



Cet axe de symétrie coupe l'angle (les angles saillant et rentrant) en deux angles de même amplitude (ils sont superposés).


Première définition de la *bissectrice d'un angle*

**Dans un plan, la bissectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle.**

Deuxième définition de la *bissectrice d'un angle*

**Dans un plan, la bissectrice d'un angle, est la droite qui divise cet angle en deux angles de même amplitude.**

- Construis tous les points du plan qui sont à la même distance de la droite **a** que de la droite **b**.



- Que constates-tu ?

.....

Troisième définition de la *bissectrice d'un angle*

.....

.....


## 5.2. Construction

Un losange possède deux axes de symétries qui contiennent ses diagonales.

**Les diagonales d'un losange sont médiatrices l'une de l'autre et bissectrices des angles qu'elles coupent.**

Pour construire la bissectrice de l'angle  $A\hat{O}B$ , il suffit de construire un losange dont un des angles est  $A\hat{O}B$  :

Aide : <https://www.geogebra.org/m/wRa7keuG>




## 6. LES TRIANGLES

### 6.1. Triangle isocèle

**Un triangle est isocèle ssi il a (au moins) deux côtés de même longueur**

**Iso / cèle**



En grec :


*Isos* qui signifie « égal » et *Skalos* qui signifie « jambe »

Remarques :


- Le côté inégal est appelé **base** du triangle, et l'angle opposé à cette base **angle au sommet**.
- Deux triangles isocèles « accolés » par leur base forment un losange. Nous avons vu précédemment que dans tout losange, les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre et bissectrices des angles qu'elles coupent. Donc :

### Propriété des triangles isocèles

Dans un triangle isocèle, la médiatrice de la base est aussi la bissectrice de l'angle au sommet (médiane et hauteur relative à la base).



### 6.2. Triangle équilatéral



Equi / latéral

En latin :

*Aequus* qui signifie « égal » et *Latus* qui signifie « côté »


Un triangle est *équilatéral* ssi ses trois côtés sont de même longueur

#### Remarques :

- Le triangle équilatéral possède toutes les caractéristiques du triangle isocèle ; tout triangle équilatéral est isocèle.
- Tout triangle équilatéral possède trois axes de symétries :


### Propriété des triangles équilatéraux

Dans un triangle équilatéral, chaque médiatrice est aussi bissectrice de l'angle qu'elle coupe (médiane et hauteur relative au côté).



### 6.3. Triangle rectangle

Un triangle est rectangle ssi il possède un angle droit




Remarques :

- Le côté opposé à l'angle droit est appelé l'**hypoténuse** du triangle rectangle ; les côtés de l'angle droit sont appelés **cathètes**.
- Un triangle rectangle peut être isocèle.

### 6.4. Droites remarquables dans un triangle (hauteur, médiane, médiatrice et bissectrice)

#### 1) Médiannes d'un triangle


Une *médiane* d'un triangle est un segment qui relie un sommet au milieu du côté opposé.



Les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point appelé **centre de gravité** du triangle.

#### 2) Hauteurs d'un triangle



Une *hauteur* d'un triangle est un segment abaissé d'un sommet perpendiculairement au côté opposé (ou à son prolongement).



Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un même point appelé **orthocentre** du triangle.

### 3] Médiatrices d'un triangle



Une *médiatrice* d'un triangle est une droite perpendiculaire au milieu du côté opposé.




Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point appelé **centre du cercle circonscrit** au triangle.

### 4] Bissectrices d'un triangle

Une *bissectrice* d'un triangle est une droite qui divise un angle intérieur du triangle en deux angles de même amplitude.



Les trois bissectrices d'un triangle se coupent en un même point appelé **centre du cercle inscrit** au triangle.



## 7. LES QUADRILATERES

### 7.1. Le carré

Un **carré** est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur et ses quatre angles droits.

### 7.2. Le rectangle

Un **rectangle** est un quadrilatère qui a ses angles droits.

- Tous les carrés sont des rectangles puisqu'ils ont quatre angles droits.

### 7.3. Le losange

Un **losange** est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur.

- Tous les carrés sont des losanges puisqu'ils ont quatre côtés de même longueur.
- Losange vient du mot gaulois *lausa* qui signifie dalle.

### 7.4. Le parallélogramme

Un **parallélogramme** est un quadrilatère qui a deux paires de côtés parallèles.

- Tous les carrés, tous les losanges et tous les rectangles sont des parallélogrammes puisqu'ils ont deux paires de côtés parallèles.
- Le mot parallélogramme se divise en deux : « gramme » d'un mot grec qui veut dire « chose écrite », « trait » et parallèle. Un parallélogramme est formé par « des traits parallèles »


### 7.5. Le trapèze

Un **trapèze** est un quadrilatère qui a au moins deux côtés parallèles.

- Trapèze vient du grec *trapezion* qui signifie « petite table ».
- Tous les carrés, tous les losanges, tous les rectangles et tous les parallélogrammes sont des trapèzes puisqu'ils ont deux côtés parallèles

### 7.6. Le cerf-volant

Un **cerf-volant** est un quadrilatère qui possède deux paires de côtés consécutifs de même longueur.




- Tous les carrés et tous les losanges sont des cerfs-volants.

## 7.7. Propriétés des quadrilatères et symétries

### 1] Le parallélogramme

Tout parallélogramme peut être construit à partir de deux triangles accolés par un côté. Ces triangles sont symétriques l'un par rapport à l'autre par une symétrie centrale. Par cette symétrie, certains éléments du parallélogramme sont envoyés l'un sur l'autre. En vertu des invariants des symétries centrales, plusieurs propriétés apparaissent :

- les côtés opposés ont la même longueur ;
- les angles opposés ont la même amplitude
- les diagonales se coupent en leur milieu.





### 2] Le rectangle

Tout rectangle peut être construit à partir de deux triangles rectangles accolés par l'hypoténuse. Ces triangles sont symétriques l'un par rapport à l'autre par une symétrie centrale dont le centre est le milieu de l'hypoténuse. **Le rectangle a les mêmes propriétés que le parallélogramme.**

Un rectangle possède aussi deux axes de symétries : ses médianes. En vertu des invariants des symétries axiales, plusieurs propriétés supplémentaires apparaissent :

- les diagonales ont même longueur,
- les médianes sont médiatrices l'une de l'autre.





### 3] Le losange

Tout losange peut être construit à partir de deux triangles isocèles accolés par leur base. Ces triangles sont symétriques l'un par rapport à l'autre par une symétrie centrale dont le centre est le milieu de cette base. **Le losange a les mêmes propriétés que le parallélogramme.**

Un losange possède aussi deux axes de symétries : ses diagonales. En vertu des invariants des symétries axiales, plusieurs propriétés supplémentaires apparaissent :

- ses médianes se coupent en leur milieu et ont même longueur ;
- ses diagonales sont médiatrices l'une de l'autre et bissectrices des angles qu'elles coupent.





#### 4] Le carré

Tout carré peut être construit à partir de deux triangles rectangles isocèles accolés par leur hypoténuse. Ces triangles sont symétriques l'un par rapport à l'autre par une symétrie centrale dont le centre est le milieu de cette hypoténuse. **Le carré a les mêmes propriétés que le rectangle et le losange.**

Un carré possède quatre axes de symétries : ses diagonales et ses médianes. En vertu des invariants des symétries axiales, plusieurs propriétés supplémentaires apparaissent :

- *ses médianes ont même longueur et sont médiatrices l'une de l'autre*
- *ses diagonales sont médiatrices l'une de l'autre et bissectrices des angles qu'elles coupent.*




#### 7.8. Définitions en chaîne

En résumé :

- Le losange, le rectangle et le carré sont des parallélogrammes.
- Le carré est un rectangle.
- Le carré est un losange.

Ce qui donne la chaîne suivante :



Nous pouvons aussi enchaîner leurs définitions :










- Le **trapèze** est un **quadrilatère** qui a une paire de côtés parallèles.
- Le **parallélogramme** est un **trapèze** qui a deux paires de côtés parallèles.
- Le **losange** est un **parallélogramme** qui a quatre côtés de même longueur.
- Le **rectangle** est un **parallélogramme** qui a quatre angles droits.
- Un **carré** est un **losange** qui a quatre angles droits ou un **carré** est un **rectangle** qui a quatre côtés de même longueur.

De plus :

- Le **cerf-volant** est un **quadrilatère** qui a deux paires de côtés consécutifs de même longueur.
- Le **losange** est un **cerf-volant** dont les côtés opposés ont même longueur.



### 7.9. Exercices supplémentaires

1] Les 9 triangles ci-dessous ont été dessinés à main levée :

- c) Reproduis-les en vrai grandeur.  
d) Ecris un message permettant à quelqu'un qui ne voit pas le triangle DEF de le reproduire.

2] Dans chacun des cas suivants, peux-tu être sûr que le quadrilatère **ABCD** est un carré ? Justifie. (Tu ne tiens compte que des informations codées sur le dessin).



- 3] Construis un parallélogramme dont une diagonale mesure 7 cm et dont les côtés mesurent 6 et 4 cm.
- 4] Construire les quadrilatères suivants (**quand cela est possible**).
- Un quadrilatère qui a une paire de côtés parallèles et qui n'est pas un parallélogramme.
  - Un quadrilatère qui a 3 angles droits mais qui n'est pas un rectangle.
  - Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu.
  - Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur.
  - Un losange qui a un angle droit et qui n'est pas un rectangle.
  - Un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires.
  - Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires.
  - Un trapèze dont les diagonales ont même longueur.
- 5] Soit un segment  $[AC]$  de 5 cm qui est la diagonale d'un parallélogramme. Si la mesure de l'autre diagonale est de 7 cm, où peuvent se trouver les sommets B et D de ce parallélogramme ?
- 6] Soit un segment  $[AC]$  de 5 cm qui est la diagonale d'un losange. Si la mesure de l'autre diagonale est de 7 cm, où peuvent se trouver les sommets B et D de ce losange ?
- 7] Reproduire aux instruments, à plus grande échelle, les figures suivantes :

